

Guide pour la nouvelle technologie de prévention et de
contrôle du nouveau coronavirus
Documents de formation audiovisuels
CDC Chine

Mars 2020



中国疾病预防控制中心
CHINESE CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

Soins de santé aux nouveau-nés pendant l'épidémie

Wang Danhua médecin en chef

Experts spécialement invités du Centre de santé maternelle et

infantile du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies,

Académie chinoise des sciences médicales, Hôpital Xiehe de Pékin





Fondements techniques

- ***Avis sur le renforcement du traitement et de l'accouchement sans risque des maladies maternelles pendant la prévention et le contrôle de Recommandatiola nouvelle pneumonie à coronavirus.***
Commission nationale de la santé
- ***Recommandations des experts en prévention et contrôle des infections coronariennes du nouveau-né du département de néonatalogie 2019.***
Direction du médecin néonatal de l'Association chinoise des médecins, Association chinoise de la santé maternelle et infantile Comité des professionnels de la santé des nouveau-nés, Association médicale chinoise Direction de la médecine périnatale
- ***Lignes directrices provisoires pour la prévention des nouveaux enfants atteints de pneumonie à coronavirus âgés de 0 à 6 ans CDC Chine***
Mesures de protection de base contre le nouveau coronavirus.
Organisation mondiale de la santé



Contenu du cours

- **Caractéristiques de santé du nouveau-né**
- **Gestion de la classification pendant l'épidémie**
- **Instructions de soins à domicile**
- **Reconnaissance de signes anormaux**





Caractéristiques de santé du nouveau-né

Après la naissance, la transition de la survie maternelle intra-utérine à la survie indépendante dans un environnement extra-utérin nécessite un processus de transition et d'adaptation.


Les soins aux nouveau-nés doivent être basés sur l'adaptation aux caractéristiques de leurs systèmes organiques devenant progressivement matures et les aidant à mener à bien la transition.

Selon les exigences particulières de la situation épidémique, il est particulièrement important de bien faire la gestion de la classification des nouveau-nés, ainsi que l'éducation et l'orientation des parents.



Gestion de la classification pendant l'épidémie

- **Compte tenu de la compréhension actuelle des nouvelles maladies à coronavirus, il n'est pas clair s'il existe une transmission verticale de la mère à l'enfant et si elle se transmet par le lait.**
- **De différentes mesures de gestion de la classification doivent être prises pour les nouveau-nés de différentes conditions.**
- **Les femmes maternelles sont des cas suspects, des cas confirmés et ceux qui ne se sont pas rétablis après le diagnostic.**
L'allaitement est suspendu, y compris l'allaitement direct et l'allaitement maternel.





Gestion de la classification pendant l'épidémie

Hôpitaux désignés pour la prévention et le contrôle des infections:


- **Les nouveau-nés dont l'accouchement maternel est suspecté ou confirmé et qui ont une mauvaise réponse, une dyspnée, de la fièvre ou d'autres manifestations cliniques graves doivent être rapidement transférés vers un hôpital désigné doté de solides capacités de traitement néonatal.**
- **Le transfert de nouveau-nés soupçonnés ou diagnostiqués d'accouchement de mères infectées doit être effectué strictement conformément aux exigences de l 'Avis du Bureau général de la Commission nationale de la santé sur l'impression et la distribution du nouveau programme de transfert de cas de pneumonie infectée par le COVID-19".**



Gestion de la classification pendant l'épidémie

La salle de quarantaine et d'observation:

- Les nouveau-nés soupçonnés ou diagnostiqués d'accouchement de mères infectées sont généralement en bon état, tel qu'évalué par le service néonatal et transférés au service d'observation de l'isolement néonatal.
- Pour les femmes soupçonnées d'être infectées, le test d'acide nucléique est négatif deux fois de suite, et le nouveau-né peut être transféré au service d'observation d'isolement et mettre en œuvre des soins mère-enfant dans la même chambre ou à domicile.
- Les nouveau-nés diagnostiqués avec un accouchement de mères infectées doivent être observés dans la salle de quarantaine et d'observation pendant au moins 14 jours.





Gestion de la classification pendant l'épidémie

Mère et bébé dans la même pièce:

- Les nouveau-nés nés de mères normales qui sont généralement évalués comme étant en bon état devraient avoir la mère et le bébé dans la même pièce et encourager l'allaitement.
- Pendant l'hospitalisation, les visites sont refusées. Si la mère et le bébé sont en bon état, ils peuvent rentrer chez eux ensemble.
- Avant la sortie, la vaccination de routine du vaccin contre l'hépatite B et du vaccin BCG et le dépistage des maladies néonatales doivent être terminées.



Gestion de la classification pendant l'épidémie

- Pendant l'épidémie, l'institution d'accouchement doit dispenser une éducation sanitaire au nouveau-né avant que la mère et le bébé ne sortent de l'hôpital.
- Après le congé, le personnel de santé maternelle et infantile de la communauté devrait prendre l'initiative de comprendre la situation de base de la mère et de l'enfant par téléphone, répondre aux doutes et aux problèmes de la mère et des soignants, et fournir des consultations et des conseils ciblés sur l'alimentation et les soins infirmiers du nouveau-né.
- Les guides techniques pour les soins néonataux sont les suivantes:






Instructions de soins à domicile

Fournitures environnementales:

- Salles blanches, air frais, température et humidité appropriées
- Les enfants doivent utiliser des serviettes et des ustensiles personnels
- Besoins quotidiens propres, biberons doivent être nettoyés et désinfectés
- Les non-soignants doivent se rendre dans la chambre de l'enfant le moins possible et refuser de visiter
- Aucune désinfection spéciale n'est requise pour les pièces, les sols et les objets sans circonstances particulières





Instructions de soins à domicile

Nutrition et alimentation:

- **Promouvoir l'allaitement maternel, l'allaitement au besoin, > 10-12 fois / jour**
- **Encourager le contact cutané entre la mère et l'enfant**
- **Supplémenter la vitamine D de routine**
- **Le régime alimentaire de la mère est équilibré, prêtez attention à la loi de la vie et assurez le sommeil**



Instructions de soins à domicile

Entretien:

- **Gardez au chaud et évitez la surchauffe**
- **Observer la température corporelle, la couleur de la peau, la respiration, l'allaitement et les selles**
- **Gardez votre peau propre, changez les couches et lavez vos hanches à temps**
- **Gardez l'ombilic au sec, pas besoin d'envelopper**



Instructions de soins à domicile

Mère et soignante:

- Assurer une bonne santé, faire attention à l'hygiène personnelle
- Se laver soigneusement les mains avant de toucher les enfants et après avoir manipulé les excréments
- Nettoyer la peau du sein lorsque la mère allaite, porter un masque si nécessaire
- Ne pas embrasser l'enfant, ne tousser ou éternuer à l'enfant
- Essayez de ne pas sortir, comme vous laver les mains, vous laver et vous changer si vous revenez
- Les personnes présentant des symptômes d'infections des voies respiratoires à la maison doivent être isolées



Reconnaissance de signes anormaux

- **Pendant la période épidémique, le personnel médical de la communauté ne peut pas effectuer les visites néonatales de routine à temps, de sorte que les mères et les soignants doivent apprendre à observer de près les performances de l' enfant et à trouver des signes anormaux à temps.**
- **Observation: réaction mentale, sommeil, pleurs, température corporelle, poids corporel, couleur de la peau, respiration, allaitement et miction**





Signes anormaux nécessitant une consultation

- **Température corporelle > 37,5 °C ou <36,5 °C**
- **La perte de poids dépasse 10% du poids à la naissance, ne revient pas au poids à la naissance dans la semaine ou ne prend pas de poids**
- **Difficultés d'alimentation**
- **Peau jaune, impliquant le tronc et les extrémités proximales; éruption cutanée, rougeur autour des ongles**
- **Il y a des sécrétions ombilicales**



Signes anormaux nécessitant une consultation

- **Température corporelle > 38,5 °C ou <35,5 °C**
- **Mauvaise réponse mentale, ne pleure pas et bouge moins**
- **Sucer la faiblesse, refuser le lait, ballonnements, vomissements fréquents ou diarrhée**
- **Respiration > 60 fois / min ou <20 fois / min, irrégulière, dyspnée avec cyanose**
- **Fréquence cardiaque > 160 battements / min ou <100 battements / min, arythmie évidente**



Signes anormaux nécessitant une consultation

- **Convulsions (clignements répétés, regards fixes, contractions des membres, etc.)**
- **La peau est visiblement jaunâtre, impliquant les extrémités des membres et les paumes, les mains et les pieds**
- **Dépression des orbites et du bregma, mauvaise élasticité de la peau, oligurie et autres signes de déshydratation**
- **La peau ronde ombilicale est rouge et enflée, et il y a de nombreuses sécrétions dans l'ombilic**
- **Gonflement des paupières, hyperémie conjonctivale et sécrétions excessives**

Étant donné que la compréhension du nouveau coronavirus et des maladies causées est toujours en cours de compréhension et de recherche continues, les recommandations pertinentes seront également mises à jour en fonction de l'accumulation d'informations et de preuves en matière de prévention et de contrôle.

Produit par le Centre de santé
maternelle et infantile du CDC Chine