

2026 年 7 月全球传染病事件风险评估

摘要：目的 对 2026 年 7 月中国境外发生的全球传染病事件进行监测，并评估对我国的输入风险和海外旅行风险。**方法** 运用多种来源的互联网开源情报信息，对重点关注传染病开展基于事件的监测，并采用风险矩阵法，从传播可能性和后果严重性两个维度，整合疾病、国家和地区和事件特异性指标构建指标体系，对传染病境外输入风险和海外旅行风险开展评估。**结果** 2026 年 7 月监测到 15 种传染病在全球 40 个国家或地区形成突发事件或暴发疫情。对我国的输入风险方面，高风险事件 6 个，中风险事件 23 个；海外旅行风险方面，高风险事件 11 个，中风险事件 15 个。**结论** 输入风险方面，建议重点关注马来西亚、泰国、柬埔寨、老挝、孟加拉国、斯里兰卡的登革热疫情，一般关注特定国家或地区的登革热、霍乱、基孔肯雅热、麻疹、鼠疫、西尼罗病毒病、寨卡病毒病疫情。海外旅行风险方面，建议重点关注苏丹、柬埔寨、孟加拉国、斯里兰卡的登革热疫情，中非共和国、尼日利亚、苏丹、喀麦隆的霍乱疫情，马尔代夫、孟加拉国、刚果民主共和国的麻疹疫情；一般关注特定国家的埃博拉、白喉、登革热、基孔肯雅热、麻疹、鼠疫、西尼罗病毒病疫情。

关键词：全球传染病；事件监测；风险评估；开源情报

Risk assessment of global infectious disease events in July 2026

Abstract: Objectives To detect global infectious disease events occurring outside China in July 2026 and assess the importation risk to China and international travel risk. **Methods** Utilizing open-source intelligence on the internet, this study conducts event-based surveillance of priority infectious diseases and adopts the risk matrix methodology to build an indicator system by integrating disease-, country- and event-specific indicators in terms of transmission likelihood and severity of consequences in order to assess the risk of the importation and the risk of international travel. **Results** In July 2026, 15 infectious diseases were detected to form events or outbreaks in 40 countries or regions worldwide. In terms of importation risk to China, there are 6 high-risk events and 23 medium-risk events; in terms of international travel risk, there are 11 high-risk events and 15 medium-risk events. **Conclusion** For importation risk, it is recommended to pay close attention to the dengue fever outbreaks in Malaysia, Thailand, Cambodia, Laos, Bangladesh, and Sri Lanka, and pay general attention to dengue fever, cholera, chikungunya, measles, plague, West Nile fever, and Zika virus disease in specific countries or regions. For international travel risk, it is recommended to pay close attention to the dengue fever outbreaks in Sudan, Cambodia, Bangladesh, and Sri Lanka, the cholera outbreaks in the Central African Republic, Nigeria, Sudan, and Cameroon, and the measles outbreak in Maldives, Bangladesh, and the Democratic Republic of the Congo, and pay general attention to Ebola virus disease, diphtheria, dengue fever, chikungunya, measles, plague, and West Nile fever in specific countries.

近年来，全球新发突发传染病疫情频发，对人类的生命健康和经济社会发展造成重大威胁。中国积极推动共建“一带一路”倡议，出入境人员和货物往来频繁，为传染病的跨境传播制造了有利条件，给我国带来双重风险，包括境外传染病输入传播风险，以及出国（境）人员在海外旅行时感染传染病风险。互联网开源信息为开展全球传染病监测和风险评估提供数据资源，现回顾 2026 年 7 月境外发生的全球传染病事件并报告风险评估结果，为发现和防范输入风险及海外旅行风险提供参考和依据。

1 评估方法和依据

2026 年 7 月全球传染病事件发生情况数据截至 2026 年 7 月 31 日，评估范围、信息来源、评估方法、数据处理方法见《2024 年 1 月全球传染病事件风险评估》、《2026 年 5 月全球传染病事件风险评估》。

2 评估结果

2.1 总体概述

2026 年 7 月，监测到埃博拉病毒病、白喉、登革热、猴痘、环孢子虫病、霍乱、基孔肯雅热、脊髓灰质炎、克里米亚-刚果出血热、拉沙热、麻疹、美洲锥虫病、鼠疫、西尼罗病毒病、寨卡病毒病在全球 40 个国家或地区形成突发事件或暴发疫情。对我国的输入风险方面，高风险事件 6 个，中风险事件 23 个，低风险事件 29 个。海外旅行风险方面，高风险事件 11 个，中风险事件 15 个，低风险事件 32 个。全球范围内关注埃博拉病毒病、西尼罗病毒病、登革热、麻疹、霍乱等疫情流行情况。详见表 1。

表 1 2026 年 7 月全球重点传染病事件和风险评估结果

Table 1 Global priority infectious disease events and risk assessment results in July, 2026

疾病	大洲	国家	统计起始日	报告截止	累计病例数(例)	累计死亡	境外输入	海外旅行
----	----	----	-------	------	----------	------	------	------

			期	日期	（疑似/确诊）	数（例）	风险等级	风险等级
			（年-月- 日）	（年-月- 日）				
埃博拉病毒病	非洲	刚果民主共 和国	2026-5-15	2026-7-30	3 605	1 581	低	中
	非洲	乌干达	2026-5-15	2026-7-21	20/1	2/1	低	中
白喉	非洲	尼日利亚	2026-1-1	2026-7-19	4	1	低	中
	非洲	苏丹	2026-1-1	2026-7-24	3 300+	39+	中	高
	南美洲	厄瓜多尔	2026-1-1	2026-7-27	23 306	25	中	低
	南美洲	巴西	2026-1-1	2026-7-27	424 970	-	中	低
	南美洲	秘鲁	2026-1-1	2026-7-28	38 800	42	中	低
	亚洲	马来西亚	2026-1-1	2026-7-31	11 493	-	高	中
登革热	亚洲	泰国	2026-1-1	2026-7-31	6 442	-	高	中
	亚洲	柬埔寨	2026-1-1	2026-7-31	9 493	-	高	高
	亚洲	老挝	2026-7-1	2026-7-31	603	-	高	中
	亚洲	孟加拉国	2026-1-1	2026-7-24	12 640	40	高	高
	亚洲	斯里兰卡	2026-1-1	2026-7-31	34 874	61	高	高
	亚洲	中国台湾	2026-1-1	2026-7-24	100	-	中	低
	非洲	留尼汪岛	2026-1-1	2026-7-10	25	-	低	低
	非洲	科特迪瓦	2024-7-1	2026-7-14	269/111	3	低	低
猴痘	非洲	安哥拉	2026-1-1	2026-7-28	14	-	低	低
	非洲	马达加斯加	2025-12-18	2025-7-23	3 048	20	低	低
	欧洲	西班牙	2026-7-24	2026-7-30	4	-	低	低
	北美洲	美国	2026-1-1	2026-7-23	11 500+	0	低	低
环孢子虫病	非洲	中非共和国	2026-6-26	2026-7-22	疑似 650	44	中	高
霍乱	非洲	尼日利亚	2026-6-1	2026-7-28	疑似 35 000+	212	中	高
	非洲	苏丹	2026-5-1	2026-7-28	疑似 2 000+	170	中	高
	非洲	喀麦隆	2026-6-1	2026-7-25	585	19	中	高
	南美洲	哥斯达黎加	2026-1-1	2026-7-23	47	-	中	低
基孔肯雅热	南美洲	巴西	2026-1-1	2026-7-27	110 569	-	中	中
	欧洲	法国	2026-7-25	2026-7-25	1	-	中	中
	欧洲	西班牙	2026-1-1	2026-7-30	108	-	中	中
	非洲	中非共和国	2026-6-24	2026-7-28	2	-	低	低
	非洲	南苏丹	2026-6-24	2026-7-28	2	-	低	低
	非洲	乍得	2026-6-24	2026-7-28	4	-	低	低
	非洲	埃塞俄比亚	2026-6-24	2026-7-28	4	-	低	低
	非洲	刚果民主共 和国	2026-6-24	2026-7-28	2	-	低	低
	非洲	尼日利亚	2026-6-24	2026-7-28	3	-	低	低
	亚洲	老挝	2026-6-24	2026-7-28	2	-	低	低
克里米亚-刚果	亚洲	阿富汗	2026-6-24	2026-7-28	9	-	低	低
	欧洲	西班牙	2026-7-11	2026-7-29	1/1	1	低	低
出血热	亚洲	伊朗	2026-1-1	2026-7-22	3	-	低	低
拉沙热	非洲	尼日利亚	2026-1-1	2026-7-12	963	229	低	低
麻疹	北美洲	美国	2026-1-1	2026-7-30	2 371	-	中	低
	北美洲	墨西哥	2026-1-1	2026-7-27	19 074	45	低	中

美洲锥虫病	亚洲	马尔代夫	2026-7-1	2026-7-31	164	-	低	高
	亚洲	孟加拉国	2026-3-15	2026-7-26	15 442/12 753	95/725	中	高
	非洲	刚果民主共和国	2026-6-29	2026-7-19	10 550	217	低	高
	北美洲	美国	2026-1-1	2026-7-7	1	-	低	低
	北美洲	美国	2026-7-14	2026-7-14	1	-	中	中
	亚洲	蒙古	2026-7-22	2026-7-22	1	-	中	中
	北美洲	美国	2026-1-1	2026-7-28	113	-	中	中
	北美洲	加拿大	2026-1-1	2026-7-30	14	-	中	低
	欧洲	俄罗斯	2026-7-13	2026-7-13	1	-	低	低
	欧洲	西班牙	2026-7-1	2026-7-31	11	-	中	低
西尼罗病毒病	欧洲	北马其顿	2026-1-1	2026-7-29	8	-	低	低
	欧洲	希腊	2026-1-1	2026-7-29	42	-	中	中
	欧洲	意大利	2026-1-1	2026-7-29	94	-	中	中
	欧洲	罗马尼亚	2026-1-1	2026-7-29	5	-	低	低
	欧洲	法国	2026-1-1	2026-7-29	2	-	低	低
	欧洲	德国	2026-1-1	2026-7-29	1	-	低	低
	亚洲	以色列	2026-7-16	2026-7-16	1	-	低	低
	南美洲	巴西	2026-1-1	2026-7-23	9 810	-	中	低

注：数据来自国际组织、卫生部门、学术团体、新闻媒体和社交媒体等正式和非正式的互联网开源信息渠道关于境外传染病事件的报道，累计病例数和累计死亡数按照（疑似/确诊）的格式标注，疑似不包括确诊，原数据中未明确标明是疑似还是确诊的病例不做特殊标注；“-”表示无数据，“+”表示超过该数值但是具体数值不明确。

2.2 境外输入风险

境外输入风险方面，7月的高风险事件均分布在亚洲，为马来西亚、泰国、柬埔寨、老挝、孟加拉国、斯里兰卡的登革热疫情。中风险事件分布在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲和非洲，包括苏丹、厄瓜多尔、巴西、秘鲁、中国台湾地区的登革热疫情，中非共和国、尼日利亚、苏丹、喀麦隆的霍乱疫情，哥斯达黎加、巴西、法国、西班牙的基孔肯雅热疫情，美国、孟加拉国的麻疹疫情，美国、蒙古的鼠疫病例，美国、加拿大、西班牙、希腊、意大利的西尼罗病毒病疫情，巴西的寨卡病毒病疫情。其余均为低风险事件。

登革热：2026年年初至7月24日，苏丹达玛津市累计报告登革热病例超过3 000例，死亡数十例，青尼罗州累计报告的登革热病例超过350例，死亡39例。2026年年初截至7月27日，巴西共报告疑似登革热病例424 970例，较去年同期下降71%。2026年年初至7月27日，厄瓜多尔累计报告23 306例登革热病例，比去年同期减少约23%，死亡25例，马纳比省病例居多。2026年年初至7月28日，秘鲁累计报告34 820例登革热病例，比去年同期增加约22%，死亡25例，死亡42例。2026年年初至7月31日，斯里兰卡累计报告34 874例登革热病例，死亡61例，是该国十余年来最严重的登革热暴发。2026年年初至7月24日，孟加拉国累计报告12 640例登革热病例，死亡40例。2026年年初至7月末，马来西亚累计报告登革热病例约11 493例，比上个月上升7.1%。2026年年初至7月末，柬埔寨累计报告登革热病例约9 493例，比上个月上升243%。2026年年初至7月末，泰国累计报告登革热病例约6 442例，比上个月上升103.5%。2026年年初至7月末，柬埔寨累计报告登革热病例约9 493例，比上个月上升243%。2026年年初至7月末，老挝累计报告登革热病例约603例，比上个月上升123.3%。2026年年初至7月24日，中国台湾累计报告100例登革热病例，其中7例为本地传播。进入8月，气温逐渐升高，降雨更加频繁，登革热的蚊虫媒介繁殖加快，使登革热的防控进入关键阶段。

霍乱：自6月26日中非共和国宣布霍乱疫情暴发至7月22日，中非共和国共报告疑似霍乱病例650例，44例死亡。2026年年初至7月28日，尼日利亚博尔诺州报告疑似霍乱病例超过35 000例，死亡198例，高原州报告疑似霍乱病例441例，死亡14例。6月30日，WHO宣布苏丹中部西科尔多凡州和北科尔多凡州暴发霍乱疫情，截至7月28日，已报告超过2 000例疑似病例和170例死亡。6月24日，中非首都班吉附近的本博和姆巴耶克地区报告197例霍乱病例和24例死亡。2026年6月至7月25日，喀麦隆极

北地区累计报告 585 例霍乱病例，19 例死亡，儿童受影响尤为严重。

基孔肯雅热：2026 年年初至 7 月 27 日，巴西全国报告基孔肯雅热病例 110 569 例，较去年同期下降 48%。哥斯达黎加在数周内基孔肯雅热病例数由 11 例提高到 7 月 23 日的 47 例。7 月 30 日，法国南部塔恩省发现首例本地传播的基孔肯雅热病例。2026 年年初至 7 月 30 日，西班牙累计确诊基孔肯雅热病例 108 例，较去年同期上升 300%。

鼠疫：7 月 14 日，美国新墨西哥州发现一例鼠疫病例，此前该州曾发现一例野鼠鼠疫病例。7 月 24 日，蒙古与中国接壤的科布多地区报告一例腺鼠疫病例，患者因食用携带鼠疫的旱獭而感染。

麻疹：2026 年年初至 7 月 30 日，美国已累计报告 2 371 例麻疹病例，超过 2025 年全年病例数，为该国 1992 年以来的最高水平。孟加拉国自 3 月 15 日暴发麻疹疫情以来，截至 7 月 26 日，累计确诊麻疹病例 15 442 例，疑似病例 123 753 例，死亡总数 820 例，确诊死亡 95 例。

西尼罗病毒病：2026 年年初至 7 月 28 日，美国累计确诊西尼罗病毒病病例 113 例。2026 年年初至 7 月 30 日，加拿大累计确诊西尼罗病毒病病例 14 例。2026 年 7 月，西班牙新增西尼罗病毒病病例 11 例，其中 8 例为神经侵袭性。2026 年年初至 7 月 29 日，希腊累计确诊西尼罗病毒病病例 42 例。2026 年年初至 7 月 29 日，意大利累计确诊西尼罗病毒病病例 94 例。西尼罗病毒病的传播一般在 7-9 月达到高峰，世界卫生组织（World Health Organization, WHO）呼吁提高警惕。

寨卡病毒病：2026 年年初截至 7 月 23 日，巴西共报告疑似登革热病例 9 810 例，较去年同期下降 50%。

2.3 海外旅行风险

海外旅行风险方面，7 月的高风险事件分布在亚洲和非洲，包括苏丹、柬埔寨、孟加拉国、斯里兰卡的登革热疫情，中非共和国、尼日利亚、苏丹、喀麦隆的霍乱疫情，马尔代夫、孟加拉国、刚果民主共和国的麻疹疫情。中风险事件分布在欧洲、亚洲、非洲、南美洲、北美洲，包括刚果民主共和国、乌干达的埃博拉疫情，尼日利亚的白喉疫情，马来西亚、泰国、老挝的登革热疫情，巴西、法国、西班牙的基孔肯雅热疫情，墨西哥的麻疹疫情，美国、蒙古的鼠疫病例，美国、希腊、意大利的西尼罗病毒病疫情。其余均为低风险事件。

埃博拉病毒病：WHO 报道，截至 7 月 30 日，刚果民主共和国共报告 3 605 例埃博拉病毒病确诊病例，1 581 例确诊死亡，疫情以埃博拉出现以来最快的速度扩散；截至 7 月 21 日，乌干达共报告 20 例确诊病例，2 例确诊死亡病例，另有 1 例疑似病例，1 例疑似死亡病例。疫情主要集中在刚果民主共和国东部，尤其是伊图里省，同时波及北基伍省、南基伍省、上韦莱省和乔波省；乌干达疫情与刚果民主共和国传播链相关，主要表现为输入病例及其相关的有限二代传播，已于 7 月 28 日宣布暴发结束。

白喉：7 月 19 日，尼日利亚尼日尔州报告 4 例疑似白喉病例和 1 例死亡，死者为一名儿童。

麻疹：自墨西哥麻疹疫情暴发以来，截至 7 月 27 日，累计确诊麻疹病例 19 074 例，死亡 45 例，病例数较 2025 年全年上升 188%。死亡分布在 11 个州，其中奇奇瓦州死亡人数最多。7 月，马尔代夫新增麻疹病例 164 例，为 6 月的 10.9 倍。6 月 29 日至 7 月 19 日，刚果民主共和国新增麻疹病例 10 550 例，占非洲新增麻疹病例的 84%，死亡 217 例，占非洲死亡数的 86%。

其余海外旅行中高风险事件详情见 2.2。

2.4 动物疫情

7 月监测发现以下动物疫情事件。**亚洲：**尼泊尔、印度尼西亚、菲律宾报告禽类高致病性禽流感（highly pathogenic avian influenza, HPAI）疫情，菲律宾、尼泊尔、印度、越南、日本、印度尼西亚、中国台湾地区报告非洲猪瘟疫情，柬埔寨、印度尼西亚报告口蹄疫疫情。**欧洲：**西班牙报告家禽新城疫疫情，英国报告马流感疫情，芬兰、俄罗斯、立陶宛、波兰、塞尔维亚、克罗地亚报告非洲猪瘟疫情，波黑、俄罗斯报告牛布鲁氏菌病疫情，西班牙报告钩端螺旋体病病例。**北美洲：**美国报告东部马脑炎病例和新大陆螺旋蝇蛆病疫情，加拿大报告禽类 HPAI 疫情，墨西哥报告新大陆螺旋蝇蛆病和鸟类 HPAI 疫情，洪都拉斯报告新大陆螺旋蝇蛆病疫情。**南美洲：**巴西报告新大陆螺旋蝇蛆病疫情、猴子黄热病病例和家禽 HPAI 疫情，乌拉圭报告新大陆螺旋蝇蛆病疫情，秘鲁报告家禽 HPAI 疫情，哥伦比亚报告 HPAI 疫情。**非洲：**多哥报告禽类 HPAI 疫情，科特迪瓦报告非洲猪瘟疫情，南非报告口蹄疫疫情，卢旺达报告牛裂谷热疫情。**大洋洲：**澳大利亚、新西兰报告野生鸟类 HPAI 疫情。

3 讨论

2026 年 7 月全球传染病事件监测到埃博拉病毒病、白喉、登革热、猴痘、环孢子虫病、霍乱、基孔肯雅热、脊髓灰质炎、克里米亚-刚果出血热、拉沙热、麻疹、美洲锥虫病、鼠疫、西尼罗病毒病、寨卡病毒病在全球 40 个国家或地区形成突发事件或暴发疫情。对我国的输入风险方面，高风险事件 6 个，中风险事件 23 个，低风险事件 29 个；建议重点关注马来西亚、泰国、柬埔寨、老挝、孟加拉国、斯里兰卡的登革热疫情；一般关注苏丹、厄瓜多尔、巴西、秘鲁、中国台湾地区的登革热疫情，中非共和国、尼日利亚、苏丹、喀麦隆的霍乱疫情，哥斯达黎加、巴西、法国、西班牙的基孔肯雅热疫情，美国、孟加拉国的麻疹疫情，美国、蒙古的鼠疫病例，美国、加拿大、西班牙、希腊、意大利的西尼罗病毒病疫情，巴西的寨卡病毒病疫情。海外旅行风险方面，高风险事件 11 个，中风险事件 15 个，低风险事件 32 个；建议重点关注苏丹、柬埔寨、孟加拉国、斯里兰卡的登革热疫情，中非共和国、尼日利亚、苏丹、喀麦隆的霍乱疫情，马尔代夫、孟加拉国、刚果民主共和国的麻疹疫情；一般关注刚果民主共和国、乌干达的埃博拉疫情，尼日利亚的白喉疫情，马来西亚、泰国、老挝的登革热疫情，巴西、法国、西班牙的基孔肯雅热疫情，墨西哥的麻疹疫情，美国、蒙古的鼠疫病例，美国、希腊、意大利的西尼罗病毒病疫情。