


流感

监测周报

10 / 2024 年

2024 年第 10 周 总第 795 期

(2024 年 3 月 4 日 - 2024 年 3 月 10 日)



中国疾病预防控制中心
病毒病预防控制所



目 录

CONTENTS

01	摘要
02	一、流感样病例报告
04	二、病原学监测
08	三、暴发疫情
11	四、人感染动物源性流感病毒疫情
12	五、动物禽流感疫情
14	六、其他国家 / 地区流感监测情况





中国流感流行情况概要（截至 2024 年 3 月 10 日）

· 监测数据显示，本周南、北方省份流感病毒检测阳性率继续下降。以 B(Victoria)系为主，其次为 A(H3N2)亚型和 A(H1N1)pdm09 亚型。全国报告 22 起流感暴发疫情。

· 2023 年 4 月 3 日 - 2024 年 3 月 10 日（以实验日期统计），A(H1N1)pdm09 亚型流感病毒 1875 株 (97.3%) 为 A/Victoria/4897/2022 的类似株；A(H3N2)亚型流感病毒 1233 株 (40.9%) 为 A/Darwin/9/2021（鸡胚株）的类似株；1219 株 (40.4%) 为 A/Darwin/6/2021（细胞株）的类似株；B(Victoria)系 1052 株 (98.7%) 为 B/Austria/1359417/2021 的类似株。

· 2023 年 4 月 3 日以来，耐药性监测显示，除 5 株 A(H1N1)pdm09 亚型流感毒株对神经氨酸酶抑制剂敏感性高度降低外，其余 A(H1N1)pdm09 亚型流感毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感；所有 A(H3N2)亚型和 B 型流感毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感。所有 A(H1N1)pdm09、A(H3N2)亚型和 B 型流感毒株均对聚合酶抑制剂敏感。

摘要

一、流感样病例报告

2024 年第 10 周（2024 年 3 月 4 日 - 2024 年 3 月 10 日），南方省份哨点医院报告的 ILI% 为 5.5%，高于前一周水平 (5.0%)，高于 2021~2022 年同期水平 (2.4% 和 3.8%)，低于 2023 年同期水平 (10.0%)。

2024 年第 10 周，北方省份哨点医院报告的 ILI% 为 4.1%，高于前一周水平 (3.8%)，高于 2021~2022 年同期水平 (1.7% 和 2.5%)，低于 2023 年同期水平 (8.8%)。

二、病原学监测

2024 年第 10 周，全国（未含港澳台地区，下同）流感监测网络实验室共检测流感样病例监测标本 10969 份。南方省份检测到 1420 份流感病毒阳性标本，其中 986 份为 B(Victoria)，1 份为 B 型（分系未显示），291 份为 A(H3N2)，142 份为 A(H1N1)pdm09。北方省份检测到 652 份流感病毒阳性标本，其中 506 份为 B(Victoria)，114 份为 A(H3N2)，32 份为 A(H1N1)pdm09。南、北方省份检测到的流感各型别及亚型的数量和所占比例具体见表 1。



表 1 流感样病例监测实验室检测结果

	第 10 周		
	南方省份	北方省份	合计
检测数	5454	5515	10969
阳性数(%)	1420(26.0%)	652(11.8%)	2072(18.9%)
A 型	433(30.5%)	146(22.4%)	579(27.9%)
A(H3N2)	291(67.2%)	114(78.1%)	405(69.9%)
A(H1N1)pdm09	142(32.8%)	32(21.9%)	174(30.1%)
A(untypeded)	0	0	0
B 型	987(69.5%)	506(77.6%)	1493(72.1%)
B 未分系	1(0.1%)	0	1(0.1%)
Victoria	986(99.9%)	506(100%)	1492(99.9%)
Yamagata	0	0	0

2024年第10周,国家流感中心对244株A(H3N2)亚型流感毒株进行抗原性分析,其中198株(81.1%)为A/Darwin/9/2021(鸡胚株)的类似株,46株(18.9%)为A/Darwin/9/2021(鸡胚株)的低反应株;其中149株(61.1%)为A/Darwin/6/2021(细胞株)的类似株,95株(38.9%)为A/Darwin/6/2021(细胞株)的低反应株。

2024年第10周,国家流感中心对78株A(H3N2)亚型流感病毒进行神经氨酸酶抑制剂耐药性分析,78株A(H3N2)亚型流感病毒均对神经氨酸酶抑制剂敏感;对234株B(Victoria)系流感病毒进行神经氨酸酶抑制剂耐药性分析,234株B(Victoria)系流感病毒均对神经氨酸酶抑制剂敏感。

三、暴发疫情

2024年第10周,全国共报告22起流感样病例暴发疫情。经检测,10起为B(Victoria),2起为B型(未分系),2起为A(H3N2),3起为A(H1N1)pdm09,5起为混合型。

流感样病例报告

(一) 南方省份流感样病例占门急诊病例总数百分比。

2024年第10周(2024年3月4日-2024年3月10日),南方省份哨点医院报告的ILI%为5.5%,高于前一周水平(5.0%),高于2021~2022年同期水平(2.4%和3.8%),低于2023年同期水平(10.0%)。(图1)




图 1 2020 – 2024 年度南方省份哨点医院报告的流感样病例%

注：数据来源于国家级哨点医院。

(二) 北方省份流感样病例占门急诊病例总数百分比。

2024 年第 10 周，北方省份哨点医院报告的 ILI% 为 4.1%，高于前一周水平 (3.8%)，高于 2021~2022 年同期水平 (1.7% 和 2.5%)，低于 2023 年同期水平 (8.8%)。(图 2)




图 2 2020 – 2024 年度北方省份哨点医院报告的流感样病例%

注：数据来源于国家级哨点医院。

病原学监测

（一）流感样病例监测。

1. 南方省份。

2024年第10周，南方省份检测到1420份流感病毒阳性标本，其中986份为B(Victoria)，1份为B型（分系未显示），291份为A(H3N2)，142份为A(H1N1)pdm09。各型别具体数据见表1和图3。2024年第9周，南方省份网络实验室分离到204株流感病毒，其中150株为B(Victoria)，43株为A(H3N2)，11株为A(H1N1)pdm09。分离的病毒型别构成见图4。




图3 南方省份ILI标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和CNIC结果不一致的以CNIC复核结果为准。




图 4 南方省份ILI标本分离毒株型别/亚型构成

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。

2. 北方省份。

2024 年第 10 周，北方省份检测到 652 份流感病毒阳性标本，其中 506 份为 B(Victoria)，114 份为 A(H3N2)，32 份为 A(H1N1)pdm09。各型别具体数据见表 1 和图 5。2024 年第 9 周，北方省份网络实验室分离到 124 株流感病毒，其中 105 株为 B(Victoria)，19 株为 A(H3N2)。分离的病毒型别构成见图 6。




图 5 北方省份ILI标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。




图 6 北方省份 ILI 标本分离毒株型别/亚型构成

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。

(二) ILI 暴发疫情实验室检测结果。

1. 南方省份。

2024 年第 10 周，南方省份网络实验室收检到 245 份流感样病例暴发疫情标本，检测到流感阳性标本 150 份，其中 94 份为 B(Victoria)，33 份为 A(H1N1)pdm09，23 份为 A(H3N2)。(图 7)




图 7 南方省份 ILI 暴发疫情标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。



2. 北方省份。

2024 年第 10 周，北方省份网络实验室收检到 49 份流感样病例暴发疫情标本，检测到流感阳性标本 22 份，均为 B(Victoria)。(图 8)




图 8 北方省份ILI暴发疫情标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。

(三) 抗原性分析

2024 年第 10 周，国家流感中心对 244 株 A(H3N2)亚型流感毒株进行抗原性分析，其中 198 株 (81.1%) 为 A/Darwin/9/2021 (鸡胚株) 的类似株，46 株 (18.9%) 为 A/Darwin/9/2021 (鸡胚株) 的低反应株；其中 149 株 (61.1%) 为 A/Darwin/6/2021 (细胞株) 的类似株，95 株 (38.9%) 为 A/Darwin/6/2021 (细胞株) 的低反应株。

2023 年 4 月 3 日 - 2024 年 3 月 10 日 (以实验日期统计)，CNIC 对 1927 株 A(H1N1)pdm09 亚型流感毒株进行抗原性分析，1875 株 (97.3%) 为 A/Victoria/4897/2022 的类似株，52 株 (2.7%) 为 A/Victoria/4897/2022 的低反应株。对 3016 株 A(H3N2)亚型流感毒株进行抗原性分析，其中 1233 株 (40.9%) 为 A/Darwin/9/2021 (鸡胚株) 的类似株，1783 株 (59.1%) 为 A/Darwin/9/2021 (鸡胚株) 的低反应株；其中 1219 株 (40.4%) 为 A/Darwin/6/2021 (细胞株) 的类似株，1797 株 (59.6%) 为 A/Darwin/6/2021 (细胞株) 的低反应株。对 1066 株 B(Victoria)系流感毒株进行抗原性分析，其中 1052 株 (98.7%) 为 B/Austria/1359417/2021 的类似株，14 株 (1.3%) 为 B/Austria/1359417/2021 的低反应株。

(四) 耐药性分析

2024 年第 10 周，国家流感中心对 78 株 A(H3N2)亚型流感病毒进行神经氨酸酶抑制剂耐药性分析，78 株 A(H3N2)亚型流感病毒均对神经氨酸酶抑制剂敏感；对 234 株 B(Victoria)系流感病毒进行神经氨酸酶抑制剂耐药性分析，234 株 B(Victoria)系流感病毒均对神经氨酸酶抑制剂敏感。



2023年4月3日-2024年3月10日，CNIC 耐药监测数据显示，除5株 A(H1N1)pdm09 亚型流感毒株对神经氨酸酶抑制剂敏感性高度降低外，其余 A(H1N1)pdm09 亚型流感毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感；所有 A(H3N2)亚型和 B 型流感毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感。所有 A(H1N1)pdm09、A(H3N2)亚型和 B 型流感毒株均对聚合酶抑制剂敏感。

暴发疫情

流感样病例暴发疫情定义：一周内，同一地区或单位内出现 10 例及以上流感样病例，经县（区）级疾病预防控制机构核实确认，并通过“中国流感监测信息系统”报告的疫情事件定义为 1 起流感样病例暴发疫情。

（一）本周新增报告的暴发疫情概况。

2024 年第 10 周，全国共报告 22 起流感样病例暴发疫情。经检测，10 起为 B(Victoria)，2 起为 B 型（未分系），2 起为 A(H3N2)，3 起为 A(H1N1)pdm09，5 起为混合型。

（二）暴发疫情概况。

2023 年第 14 周-2024 年第 10 周（2023 年 4 月 3 日-2024 年 3 月 10 日），全国报告流感样病例暴发疫情（10 例及以上）3234 起，经实验室检测，1818 起为 A(H3N2)，368 起为 A(H1N1)pdm09，135 起为 A 型（亚型未显示），564 起为混合感染，170 起为 B(Victoria)，54 起为 B 型（未分系），104 起为流感阴性，21 起暂未获得病原检测结果。

1. 时间分布。

2023 年第 14 周-2024 年第 10 周，南方省份共报告 2736 起 ILI 暴发疫情，高于 2023 年同期报告疫情数（2575 起）。（图 9）

2023 年第 14 周-2024 年第 10 周，北方省份共报告 498 起 ILI 暴发疫情，低于 2023 年同期报告疫情起数（604 起）。（图 10）




图 9 南方省份报告 ILI 暴发疫情周分布
(按疫情报告时间统计)





图 10 北方省份报告 ILI 暴发疫情周分布
(按疫情报告时间统计)





2. 地区分布。

2023 年第 14 周-2024 年第 10 周，全国共报告 IILI 暴发疫情 3234 起，分布在 29 个省份（表 2）。

表 2 2023 年第 14 周-2024 年第 10 周各省份报告暴发疫情起数

省份	暴发疫情起数（起）	省份	暴发疫情起数(起)
浙江省	524	江西省	39
江苏省	395	海南省	34
广东省	371	黑龙江省	33
广 西	324	湖南省	26
重庆市	294	河北省	18
安徽省	236	新 疆	18
山东省	213	辽宁省	15
四川省	126	内蒙古	12
云南省	120	甘肃省	11
福建省	107	上海市	10
贵州省	82	山西省	5
北京市	61	吉林省	1
陕西省	59	青海省	1
河南省	50	天津市	1
湖北省	48		





人感染动物源性流感病毒疫情

第 10 周，WHO 通报 5 例人感染 A(H5N1) 病例，1 例人感染 A(H5N6) 病例，2 例人感染 A(H9N2) 病例，1 例人感染 A(H10N5) 病例，2 例人感染 A(H1N1)v 病例，另有 1 例人感染 A(H9N2)v 病例被检测到。

表 3 2023 年 12 月 22 日-2024 年 2 月 26 日 WHO 通报的人感染动物源性流感病毒病例

报告型别	报告地区	性别	年龄	发病日期	住院日期	报告时病情	暴露史
A(H5N1)	柬埔寨 Prey Veng	NA	3 岁	2024.01.13	2024.01.16	已康复	与死去的家养鸡有接触
A(H5N1)	柬埔寨 Siem Reap	NA	69 岁	2024.01.21	2024.01.23	已康复	饲养家禽和斗鸡；发现三只鸡为 A(H5N1) 阳性
A(H5N1)	柬埔寨 Kratie	NA	10 岁	2024.01.31	2024.02.08	已去世于 2024.02.08	与病、死的家养鸡有接触
A(H5N1)	柬埔寨 Kratie	NA	16 岁	无症状；检于 2024.02.12	无	无	与病、死的家养鸡有接触；与上述 10 岁病例有接触
A(H5N1)	柬埔寨 Kampot	NA	17 岁	2024.02.17	2024.02.17	未报告	与死去的家养鸡有接触
A(H5N6)	中国 四川	女	59 岁	2023.11.25	2023.11.29	重症肺炎	暴露于活禽市场；环境检测 A(H5) 阳性
A(H9N2)	中国 香港	女	2 岁	2024.02.15	无	病情稳定	无已知的暴露史
A(H9N2)	中国 安徽	男	6 岁	2024.01.03	无	无	无
A(H1N1)v	巴西 Paraná	男	成年	2023.12.12	2023.12.16	已康复	无猪暴露史
A(H1N1)v	西班牙 Lleida	男	成年	2023.11.25	无	已康复	工作在当地猪场

(译自：<https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/avian-influenza/monthly-risk-assessment-summary>)

动物禽流感疫情

2024年3月3-9日，世界动物卫生组织共通报30起高致病性禽流感动物疫情事件。


表4 全球动物感染高致病性禽流感疫情事件

国家/地区	感染禽流感的亚型				
	H5N1	H5N5	H5 (N 待定)	H7N6	合计
奥地利	1				1
巴西	1				1
保加利亚	1				1
柬埔寨	1				1
加拿大	1				1
捷克	2				2
厄瓜多尔	1				1
芬兰	1				1
匈牙利	1				1
意大利	2				2
尼日利亚	1				1
波兰	1				1
罗马尼亚	1				1
塞内加尔	3				3
斯洛伐克	1				1
斯洛文尼亚	1				1
南非				1	1
南乔治亚和南桑德威奇群岛	1				1



瑞典			1		1
瑞士	1				1
英国	2	1			3
美国	3				3
合计	27	1	1	1	30

(译自: <https://wahis.woah.org/#/event-management>)



其他国家/地区 流感监测情况

全球

建议各国监测流感和 SARS-CoV-2 病毒的共同传播。临床医生应考虑流感鉴别诊断，特别是流感高危人群，并按照国家指导进行检测和治疗。年末假期导致的少报可能会影响以下数据和结论。

全球范围内，大部分北半球国家流感活动居高不下，尽管全球流感病毒检出下降。A 型仍为大多数。

北美，加拿大流感活动维持或低于过去同期水平，美国居高不下但可能已出现峰值，一些监测指标出现下降。A(H1N1)pdm09 占主导地位。

欧洲和中亚，流感活动居高不下。40 个报告国家中，2 个流感活动强度非常高，4 个活动强度高，19 个活动强度中等，13 个活动强度低，2 个活动强度低于基线，大多数国家的流感活动地理分布广泛。流感住院人数和重症监护病房（ICU）入院人数居高不下。在初级和二级保健哨点的监测中，A 型流感占主导，A(H1N1)pdm09 为主。

北非，流感检出下降，所有季节性流感型别共同流行。

东亚，流感活动持续下降。

西亚，流感活动下降，尽管阿美尼亚、格鲁吉亚、以色列报告流感活动仍高且 A 型流感为主。

中美洲和加勒比国家，流感活动总体处于低水平，A(H1N1)pdm09、A(H3N2) 为主，其次为 B(Victoria)。

热带南美洲，流感活动仍低，部分国家报告少量 A 型流感检出。

热带非洲，除少数例外，大多数报告国的流感检出率仍然很低，以 A(H3N2) 流感为主。

南亚，流感活动持续稳定在低水平，所有季节性流感型别共同流行。


东南亚，马来西亚和新加坡由所有季节性流感亚型驱动的流感活动仍高。

南半球温带地区，大多数报告国家流感监测指标处于低水平或低于季节阈值。

基于 FluNet 上数据（数据截至 2024 年 3 月 1 日），2024 年 2 月 5 日-2 月 18 日期间，全球流感监测实验室检测样本超过 544975 份，其中 96018 份检测结果为阳性，69483 份（72.4%）为 A 型，26535 份（27.6%）为 B 型。A 已分亚型样本中，6680 份（45.8%）为 A(H1N1)pdm09 流感，7900 份（54.2%）为 A(H3N2) 亚型流感；B 已分系样本中，10918 份均为 B(Victoria) 系流感。



Percentage of respiratory specimens that tested positive for influenza
By influenza transmission zone
Map generated on 01 March 2024



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data source: Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS), FluNet (www.who.int/flu-net)
Copyright WHO 2024. All rights reserved.

图 11 全球呼吸道样本流感病毒检测阳性百分比分布图




图 12 北半球流感病毒流行情况




图 13 南半球流感病毒流行情况

(译自:

<https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-updates/current-influenza-update>)

美国（第 9 周，2024 年 2 月 25 日-3 月 2 日）

美国季节性流感活动在全国范围内仍然居高不下，某些地区有所增加。

第 9 周，通过 ILINet 报告的就诊患者中有 4.1% 为流感样病例患者（即由于呼吸道疾病引起的，包括发烧伴咳嗽或咽痛，也称为 ILI）。与上周相比下降，仍高于 2.9% 的全国基线。诸多呼吸道病毒共同流行，流感病毒感染对 ILI 的影响可能因地点而异。




图 14 美国 ILI 监测周分布

第 9 周，临床实验室共检测样本 81237 份，检出 11294 份（13.9%）流感病毒阳性：其中 A 型 6428 份（56.9%），B 型 4866 份（43.1%）。2023 年第 40 周起，临床实验室累计检测样本 2346992 份，累计检出 265084 份（11.3%）流感病毒阳性：其中 A 型累计检出 194842 份（73.5%），B 型检出 70232 份（26.5%）。




图 15 美国临床实验室流感病原监测周分布



第 9 周, 美国公共卫生实验室共检测样本 2541 份, 检出 615 份流感阳性样本, 其中 437 份 (71.1%) 为 A 型、178 份 (28.9%) 为 B 型。在 286 份 (65.4%) 已分型的 A 型样本中, 164 份 (57.3%) 为 A(H1N1)pdm09 流感, 122 份 (42.7%) 为 A(H3N2)流感, 无 A(H3N2)v 流感检出, 151 份 (34.6%) 为 A 型(分型未显示);在 138 份(77.5%)已分系的 B 型样本中, 均为 B(Victoria)系流感, 无 B(Yamagata)系流感检出, 40 份 (22.5%) 为 B 型 (分系未显示)。

2023 年第 40 周起, 美国公共卫生实验室累计检测样本 83981 份, 累计检出 27069 份流感阳性样本, 其中 A 型共 21684 份 (80.1%), B 型 5385 份 (19.9%)。在 17762 份 (81.9%) 已分型的 A 型样本中, 有 13221 份 (74.4%) 为 A(H1N1)pdm09 流感、4541 份 (25.6%) 为 A(H3N2)亚型流感, 无 A(H3N2)v 流感检出, 3922 份 (18.1%)为 A 型 (分型未显示); 在 4441 份 (82.5%) 已分系的 B 型样本中, 均为 B(Victoria)系流感, 无 B(Yamagata)系流感检出, 944 份 (17.5%) 为 B 型 (分系未显示)。




图 16 美国公共卫生实验室流感病原监测周分布

第 9 周, 报告死于流感的死亡人数占全部死亡人数的 0.7%, 与上周相比稳定 (<0.1 个百分点的变化)。所提供的数据是初步的, 可能会随着接收和处理更多数据而发生变化。




图 17 美国流感死亡监测

(译自: <https://www.cdc.gov/flu/weekly/index.htm>)

日本（第9周，2024年2月26日-3月3日）

第9周，日本全国的流感定点报告数（即平均每家医疗机构收治的流感患者数）为13.96，比上一周的16.76有所减少。




图 18 日本不同地区流感流行水平分布

(译自：<https://www.niid.go.jp/niid/ja/flu-map.html#>)





韩国（第 9 周，2024 年 2 月 25 日）

第 9 周，韩国总体流感样病例占比为 14.8%，低于上周的 17.9%。2023-2024 年季节性流行阈值：6.5 例（/1000）。




图 19 韩国 ILI 监测周分布

第 9 周，6.1%的样本为流感阳性。分型结果中，B 型为 5.2%，A(H3N2)亚型为 0.9%。




图 20 韩国流感毒株检测情况

(译自：<https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a30504000000&bid=0033>)

中国香港（第9周，2024年2月25日-3月2日）

香港自一月初踏入冬季流感季节。最新监测数据显示，整体流感活跃程度仍维持在高水平。第9周，香港定点普通科诊所呈报的ILI平均比例是8.8%，低于上周的10.7%。




图 21 香港定点普通科诊所 ILI 监测周分布

第9周，香港定点私家医生所报告的ILI平均比例为37.2%，低于上周的49.2%。




图 22 香港定点私家医生 ILI 监测周分布





在第 9 周收集到的 9262 个呼吸道样本，检出 635 份 (6.86%) 流感阳性样本，其中 168 份 (28%) 为 A(H1N1)pdm09、242 份 (40%) 为 A(H3N2) 和 197 份 (32%) 为 B 型流感。流感病毒阳性率为 6.86%，低于 9.21% 的基线水平，高于前一周的 6.77%。




图 23 香港流感病原监测周分布 (上图为整体阳性率；下图为流感病毒分型阳性率)

第 9 周，本中心收到 33 起学校/院舍发生的流感样疾病暴发的报告 (共影响 148 人)，对比上周收到 14 起流感样疾病暴发的报告 (共影响 79 人)。第 10 周的前 4 天收到 21 起学校/院舍发生的流感样疾病暴发的报告 (共影响 89 人)。

整体公立医院主要诊断为流感的入院率为 0.37 (该年龄组别每 1 万人口计)，高于 0.25 的基线水平，对比前一周的 0.50。0-5 岁、6-11 岁、12-17 岁、18-49 岁、50-64 岁和 65 岁及以上人士在公立医院主要诊断为流感的入院率分别为 2.23、0.90、0.23、0.19、0.17 和 0.56 例 (该年龄组别每 1 万人口计)，对比前一周的 2.94、0.84、0.34、0.21、0.20 和 0.98 例。

(摘自: <https://www.chp.gov.hk/tc/resources/29/304.html>)

中国台湾（第 9 周，2024 年 2 月 25 日-3 月 2 日）

流感样疫情处于高原期；社区中流感病毒以 A(H3N2)为主，其次为 B 型流感；近期流感检出阳性件数及流感并发重症病例数仍多，且气温变化大，需持续留意疫情变化及重症病例发生风险。

本流感季（自 2023 年 10 月 1 日起）累计 586 例流感并发重症病例，其中 99 例死亡。

实验室传染病自动通报系统报告流感病毒阳性检测数近期趋势呈上升，近 4 周检出流感病毒 A 型占 78%，B 型占 22%。




图 24 台湾省 2022-2024 年流感阳性数趋势

门诊、急诊流感样病例百分比分别为 1.7%和 13.2%，较前一周下降，但急诊就诊百分比仍高于流行阈值 11.0%；门急诊流感就诊人次为 102031 人次，仍处高原期。




图 25 台湾省门诊及急诊流感样病例百分比



中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所编制

地 址：北京市昌平区昌百路 155 号病毒病所

邮 编：102206

电 话：010 — 58900863

传 真：010 — 58900863

电子邮箱：Fluchina@cnic.org.cn

编 辑：中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所国家流感中心

编发日期：2024 年 3 月 14 日

下 载：中国国家流感中心网站 (<https://ivdc.chinacdc.cn/cnic>) 或中国流感监测信息系统提供下载。