

流感

监测周报

43/2026 年

2026 年第 43 周 总第 932 期

(2026 年 10 月 19 日 - 2026 年 10 月 25 日)

Influenza
Weekly
Report



中国疾病预防控制中心
病毒病预防控制所



目 录

CONTENTS

01	摘要
03	一、流感样病例报告
05	二、病原学监测
08	三、暴发疫情
10	四、人感染新亚型流感疫情
11	五、动物禽流感疫情
12	六、其他国家 / 地区流感监测情况





中国流感流行情况概要（截至 2026 年 10 月 25 日）

· 监测数据显示，本周南方省份流感病毒检测阳性率略有下降、北方省份流感病毒检测阳性率略有上升，全国检出流感阳性样本中甲型流感病毒占比 67.6%、乙型流感病毒占比 32.4%；甲型流感病毒中 A(H1N1)pdm09 占比 32.8%、A(H3N2)占比 67.2%，乙型流感病毒均为 B（Victoria）系。全国共报告 145 起流感样病例暴发疫情。

· 国家流感中心对 2026 年 3 月 30 日 - 2026 年 10 月 25 日（以实验日期统计）期间收检的部分流感病毒毒株进行抗原性分析，结果显示：在 A(H1N1)pdm09 亚型流感病毒毒株中有 94.7%（72/76）为 A/Missouri/11/2025 的类似株；在 A(H3N2)亚型流感病毒毒株中有 82.6%（355/430）为 A/Darwin/1454/2025（鸡胚株）的类似株，90.0%（387/430）为 A/Darwin/1415/2025（细胞株）的类似株；在 B(Victoria)系流感病毒毒株中有 93.7%（658/702）为 B/Tokyo/EIS13-175/2025 的类似株。

· 国家流感中心对 2026 年 3 月 30 日以来收检的部分流感病毒毒株进行耐药性分析，结果显示：所有 A(H1N1)pdm09 流感病毒毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感；在 A(H3N2)亚型和 B(Victoria)系流感病毒毒株中分别有 0.2%（1/444）和 0.3%（2/659）对神经氨酸酶抑制剂敏感性降低，其余 A(H3N2)亚型和 B(Victoria)系流感病毒毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感。所有 A(H1N1)pdm09、A(H3N2)亚型和 B(Victoria)系流感病毒毒株均对聚合酶抑制剂敏感。

摘 要

一、流感样病例报告

2026 年第 43 周（2026 年 10 月 19 日 - 2026 年 10 月 25 日），南方省份哨点医院报告的 ILI%为 4.5%，与前一周水平（4.5%）持平，低于 2023 年同期水平（5.6%），高于 2024 年和 2025 年同期水平（3.3%和 4.1%）。

2026 年第 43 周，北方省份哨点医院报告的 ILI%为 3.0%，高于前一周水平（2.8%），低于 2023 年、2024 年和 2025 年同期水平（4.2%、3.2%和 3.7%）。

二、病原学监测

2026 年第 43 周，全国（未含港澳台地区，下同）流感监测网络实验室对 1041 家国家级流感样病



例监测哨点医院采集的标本开展检测，共检测 20429 份。南方省份检测到 1933 份流感病毒阳性标本，其中 271 份为 A(H1N1)pdm09，972 份为 A(H3N2)，690 份为 B(Victoria)。北方省份检测到 480 份流感病毒阳性标本，其中 263 份为 A(H1N1)pdm09，124 份为 A(H3N2)，93 份为 B(Victoria)。南、北方省份检测到的流感各型别及亚型的数量和所占比例具体见表 1。

表 1 流感样病例监测实验室检测结果

	第 43 周		
	南方省份	北方省份	合计
检测数	10720	9709	20429
阳性数(%)	1933(18.0 %)	480(4.9%)	2413(11.8%)
A 型	1243(64.3%)	387(80.6%)	1630(67.6%)
A(H1N1)pdm09	271(21.8%)	263(68.0%)	534(32.8%)
A(H3N2)	972(78.2%)	124(32.0%)	1096(67.2%)
A(unsubtyped)	0	0	0
B 型	690(35.7%)	93(19.4%)	783(32.4%)
B 未分系	0	0	0
Victoria	690(100.0%)	93(100.0%)	783(100.0%)
Yamagata	0	0	0

2026 年第 43 周,国家流感中心对 56 株 B(Victoria)系流感毒株进行抗原性分析,其中 53 株(94.6%)为 B/Tokyo/EIS13-175/2025 的类似株,3 株 (5.4%)为 B/Tokyo/EIS13-175/2025 的低反应株。

2026 年第 43 周,国家流感中心对 62 株 A(H3N2)亚型和 62 株 B(Victoria)系流感毒株进行神经氨酸酶抑制剂耐药性分析,所有毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感。

三、暴发疫情

2026 年第 43 周,全国共报告 145 起流感样病例暴发疫情。经检测,14 起为 A(H3N2),28 起为 A(H1N1)pdm09,20 起为 A 型(亚型未显示),22 起为 B(Victoria),1 起为 B 型(系未显示),22 起为混合型,3 起为流感阴性,35 起暂未获得病原检测结果。



流感样病例报告

（一）南方省份流感样病例占门急诊病例总数百分比。

2026 年第 43 周（2026 年 10 月 19 日 – 2026 年 10 月 25 日），南方省份哨点医院报告的 ILI% 为 4.5%，与前一周水平（4.5%）持平，低于 2023 年同期水平（5.6%），高于 2024 年和 2025 年同期水平（3.3%和 4.1%）。（图 1）




图 1 2023 – 2027 年度南方省份哨点医院报告的流感样病例%

注：数据来源于国家级哨点医院。

（二）北方省份流感样病例占门急诊病例总数百分比。

2026 年第 43 周，北方省份哨点医院报告的 ILI% 为 3.0%，高于前一周水平（2.8%），低于 2023 年、2024 年和 2025 年同期水平（4.2%、3.2%和 3.7%）。（图 2）




图 2 2023 – 2027 年度北方省份哨点医院报告的流感样病例%

注：数据来源于国家级哨点医院。





病原学监测

(一) 流感样病例监测

1. 南方省份。

2026 年第 43 周，南方省份检测到 1933 份流感病毒阳性标本，其中 271 份为 A(H1N1)pdm09，972 份为 A(H3N2)，690 份为 B(Victoria)。各型别具体数据见表 1 和图 3。




图 3 南方省份 ILI 标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。

2. 北方省份。

2026 年第 43 周，北方省份检测到 480 份流感病毒阳性标本，其中 263 份为 A(H1N1)pdm09，124 份为 A(H3N2)，93 份为 B(Victoria)。各型别具体数据见表 1 和图 4。




图 4 北方省份 ILI 标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。

(二) ILI 暴发疫情实验室检测结果

1. 南方省份。

2026 年第 43 周，南方省份网络实验室共收检到 367 份流感样病例暴发疫情标本，其中 142 份为 A(H1N1)pdm09，84 份为 A(H3N2)，141 份为 B(Victoria)。(图 5)




图 5 南方省份 ILI 暴发疫情标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。

2. 北方省份。

2026 年第 43 周，北方省份网络实验室共收检到 52 份流感样病例暴发疫情标本，其中 44 份为 A(H1N1)pdm09，2 份为 A(H3N2)，6 份为 B(Victoria)。(图 6)




图 6 北方省份 ILI 暴发疫情标本检测结果

注：数据来源于网络实验室检测结果，网络实验室结果和 CNIC 结果不一致的以 CNIC 复核结果为准。

(三) 抗原性分析

2026 年第 43 周，国家流感中心对 56 株 B(Victoria)系流感毒株进行抗原性分析，其中 53 株 (94.6%) 为 B/Tokyo/EIS13-175/2025 的类似株，3 株 (5.4%) 为 B/Tokyo/EIS13-175/2025 的低反应株。

2026 年 3 月 30 日 - 2026 年 10 月 25 日 (以实验日期统计)，CNIC 对 76 株 A(H1N1)pdm09 亚型流感毒株进行抗原性分析，其中 72 株 (94.7%) 为 A/Missouri/11/2025 的类似株，4 株 (5.3%) 为



A/Missouri/11/2025 的低反应株。对 430 株 A(H3N2) 亚型流感毒株进行抗原性分析, 其中 355 株 (82.6%) 为 A/Darwin/1454/2025 (鸡胚株) 的类似株, 75 株 (17.4%) 为 A/Darwin/1454/2025 (鸡胚株) 的低反应株; 其中 387 株 (90.0%) 为 A/Darwin/1415/2025 (细胞株) 的类似株, 43 株 (10.0%) 为 A/Darwin/1415/2025 (细胞株) 的低反应株。对 702 株 B(Victoria) 系流感毒株进行抗原性分析, 其中 658 株 (93.7%) 为 B/Tokyo/EIS13-175/2025 的类似株, 44 株 (6.3%) 为 B/Tokyo/EIS13-175/2025 的低反应株。

（四）耐药性分析

2026 年第 43 周, 国家流感中心对 62 株 A(H3N2) 亚型和 62 株 B(Victoria) 系流感毒株进行神经氨酸酶抑制剂耐药性分析, 所有毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感。

2026 年 3 月 30 日 - 2026 年 10 月 25 日, CNIC 耐药监测数据显示, 除 1 株 A(H3N2) 亚型和 2 株 B(Victoria) 系流感毒株对神经氨酸酶抑制剂敏感性降低外, 其余 A(H3N2) 亚型和 B(Victoria) 系流感毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感; 所有 A(H1N1)pdm09 亚型流感毒株均对神经氨酸酶抑制剂敏感。所有 A(H1N1)pdm09、A(H3N2) 亚型和 B(Victoria) 系流感毒株均对聚合酶抑制剂敏感。



暴发疫情

流感样病例暴发疫情定义：一周内，同一地区或单位内出现 10 例及以上流感样病例，经县（区）级疾病预防控制机构核实确认，并通过“中国流感监测信息系统”报告的疫情事件定义为 1 起流感样病例暴发疫情。

（一）本周新增报告的暴发疫情概况。

2026 年第 43 周，全国共报告 145 起流感样病例暴发疫情。经检测，14 起为 A(H3N2)，28 起为 A(H1N1)pdm09，20 起为 A 型（亚型未显示），22 起为 B(Victoria)，1 起为 B 型（系未显示），22 起为混合型，3 起为流感阴性，35 起暂未获得病原检测结果。

（二）暴发疫情概况。

2026 年第 14-43 周（2026 年 3 月 30 日-10 月 25 日），全国报告流感样病例暴发疫情（10 例及以上）553 起，经实验室检测，281 起为 B(Victoria)，77 起为 A(H3N2)，50 起为 A(H1N1)pdm09，21 起为 A 型（亚型未显示），5 起为 B 型（分系未显示），47 起为混合型，27 起为流感阴性，45 起暂未获得病原检测结果。

1. 时间分布。

2026 年第 14-43 周，南方省份共报告 406 起 ILI 暴发疫情，高于 2025 年同期报告疫情起数（163 起）。（图 7）

2026 年第 14-43 周，北方省份共报告 147 起 ILI 暴发疫情，高于 2025 年同期报告疫情起数（101 起）。（图 8）




图 7 南方省份报告 ILI 暴发疫情周分布
(按疫情报告时间统计)




图 8 北方省份报告 ILI 暴发疫情周分布
(按疫情报告时间统计)

2. 地区分布。

2026 年第 14-43 周，全国共报告 ILI 暴发疫情 553 起，分布在 7 个地区（表 2）。

表 2 2026 年第 14-43 周各地区报告暴发疫情起数

地区	暴发疫情起数（起）	地区	暴发疫情起数（起）
西南地区	289	华北地区	21
西北地区	40	华南地区	52
华东地区	115	华中地区	13
东北地区	23		

注：暴发疫情报告受各地监测能力及监测敏感度等因素影响。各地区省市如下：

- 东北地区：黑龙江，吉林，辽宁；
- 华北地区：北京，河北，内蒙古，山西，天津；
- 华东地区：安徽，福建，江苏，江西，山东，上海，浙江；
- 华南地区：广东，广西，海南；
- 华中地区：河南，湖北，湖南；
- 西北地区：甘肃，宁夏，青海，陕西，新疆，新疆生产建设兵团；
- 西南地区：贵州，四川，西藏，云南，重庆。

人感染新亚型流感疫情

“国家级多生态位流感病毒时空预警平台”预警预测结果显示，我国目前人感染新亚型流感病毒处于低风险水平。其中 H9N2 亚型的 A/Suzhou/1209KS/2025 类似毒株为重点关注病毒。

本周，WHO 未通报人感染新亚型流感疫情。

(译自：<https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/avian-influenza/monthly-risk-assessment-summary>)

说明：根据 2025 年修订通过的《中华人民共和国传染病防治法》，本章节更名为“人感染新亚型流感疫情”。



动物禽流感疫情

2026 年 10 月 18-24 日，世界动物卫生组织共通报 20 起高致病性禽流感动物疫情事件。

表 3 全球动物感染高致病性禽流感疫情事件

国家/地区	感染禽流感的亚型			
	H5N1	H5N5	H5(N 待定)	合计
阿尔巴尼亚	1			1
比利时	1			1
加拿大	1			1
丹麦	1			1
冰岛		1		1
爱尔兰	1			1
意大利	1			1
拉脱维亚	1		1	2
荷兰	1			1
新西兰	1			1
挪威	1	1	1	3
塞尔维亚	1			1
西班牙	1			1
苏里南			1	1
瑞典	1			1
英国	1	1		2
合计	14	3	3	20

(源自: <https://wahis.woah.org/#/event-management>)

其他国家/地区 流感监测情况

全球（数据截至 2026 年 10 月 11 日）

第 41 周，全球流感阳性率低于 10%，A 型病毒检出占主导。北半球温带和亚热带地区流感阳性率低于 10%，近三周报告检测的样本数有所减少；南半球温带和亚热带地区流感阳性率低于 10%，热带地区约为 15%。

南半球，温带和亚热带地区流感阳性率低于 10%，热带地区约为 15%；热带南美一些国家以及温带南美、东非和大洋洲个别国家流感检测阳性率超过 10%；东南亚个别国家阳性率超过 30%；热带南美个别国家监测到活动小幅上升。

北半球，中美洲和加勒比地区、西非、南亚、东南亚和东亚一些国家，以及热带南美和北欧个别国家流感检测阳性率超过 10%；西亚、南亚和东南亚一些国家，以及西非和东非个别国家阳性率超过 30%；中美洲和加勒比地区、西非、西亚、南亚和东南亚一些国家，以及西南欧、东非和东亚个别国家活动有所上升。

在阳性率升高的区域中，北欧、东非、西亚、南亚、东南亚和大洋洲以 A(H1N1)pdm09 为主，东亚以 A(H3N2)为主；中美洲和加勒比地区、热带和温带南美以及西非以 B 型为主。




图 9 北半球流感病毒流行情况




图 10 南半球流感病毒流行情况

(译自：

<https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-updates>)



美国（第 41 周，数据截至 2026 年 10 月 17 日）

本周，美国季节性流感活动低，但诸多指标出现上升。

本周通过 ILINet 报告的就诊患者中有 2.2% 为流感样病例患者（即由于呼吸道疾病引起的，包括发烧伴咳嗽或咽痛，也称为 ILI），低于基线水平（3.1%）。诸多呼吸道病毒共同流行，流感病毒感染对 ILI 的影响可能因地点而异。




图 11 美国 ILI 监测周分布

本周临床实验室共检测样本 51490 份，检出 2918 份 (5.7%) 流感病毒阳性：其中 A 型 2857 份 (97.9%)，B 型 61 份 (2.1%)。




图 12 美国临床实验室流感病原监测周分布

本周美国公共卫生实验室共检测样本 877 份，检出 323 份流感阳性样本，其中 318 份 (98.5%) 为 A 型，5 份 (1.5%) 为 B 型。在 318 份 A 型中，241 份进行了亚型分型，其中 239 份 (99.2%) 为 A(H1N1)pdm09，2 份 (0.8%) 为 A(H5)，其余 77 份未进行亚型分型，未检出 A(H3N2)和 A(H3N2)v 型流感病毒。




图 13 美国公共卫生实验室流感病原监测周分布

本周 NCHS 死亡率监测数据显示，因流感死亡病例占总死亡病例的百分比为 0.2%。




图 14 美国流感死亡监测

(译自: <https://www.cdc.gov/fluview/index.html>)

中国香港（第 42 周，2026 年 10 月 11 日-10 月 17 日）

监测数据显示，香港处于流感季节，本地流感活跃程度处于高水平。

本周香港定点普通科诊所呈报的 ILI 平均比例是 10.6%，低于前一周的 13.0%。




图 15 香港定点普通科诊所 ILI 监测周分布

本周香港定点私家医生所报告的 ILI 平均比例为 34.7%，高于前一周的 26.5%。




图 16 香港定点私家医生 ILI 监测周分布

本周收集 9710 份呼吸道样本，检出 975 份（10.04%）流感阳性样本，已分型的流感阳性样本包括 837 份（95%）A(H1N1)pdm09、19 份（2%）A(H3N2)和 29 份（3%）B 型流感。本周流感病毒阳性率高于 4.94%的基线水平，但低于前一周的 11.47%。




图 17 香港流感病原监测周分布（上图为整体阳性率；下图为流感病毒分型阳性率）

本周收到 62 起在学校/院舍发生的流感样疾病暴发的报告（共影响 307 人），对比上周的 94 起流感样疾病暴发报告（共影响 518 人）。第 43 周的前四天收到 23 起在学校/院舍发生的流感样疾病暴发的报告（共影响 120 人）。

整体公立医院主要诊断为流感的入院率为 0.46（该年龄组别每 1 万人口计），低于前一周的 0.64，高于 0.27 的基线水平。0-5 岁、6-11 岁、12-17 岁、18-49 岁、50-64 岁和 65 岁及以上人士在公立医院主要诊断为流感的入院率分别为 2.17、0.86、0.59、0.08、0.21 和 1.06 例（该年龄组别每 1 万人口计），对比前一周的 2.58、1.28、0.56、0.10、0.22 和 1.63 例。

（摘自：<https://www.chp.gov.hk/tc/resources/29/100148.html>）

中国台湾（第 41 周，2026 年 10 月 11 日-10 月 17 日）

本周，台湾流感疫情仍高，仍处流行期；流感并发重症病例数处高位，须留意重症病例发生风险；社区流感病毒以 A(H1N1)pdm09 为主。

2026-2027 流感季（自 2026 年 10 月 1 日起）累计 307 例流感并发重症，其中 42 例死亡。

实验室传染病自动通报系统（LARS）流感病毒阳性检体件数处于高点；近 4 周检出流感病毒 A 型占 98%，B 型占 2%。




图 18 流感阳性数趋势

第 41 周门诊及急诊类流感就诊病例百分比分别为 1.9%及 11.0%，处于流感流行期；门急诊就诊合计 123820 人次，较前一周略降。




图 19 门诊及急诊类流感就诊病例百分比



中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所编制

地 址：北京市昌平区昌百路 155 号病毒病所

邮 编：102206

电 话：010 — 58900863

传 真：010 — 58900863

电子邮箱：fluchina@ivdc.chinacdc.cn

编 辑：中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所国家流感中心

编发日期：2026 年 10 月 28 日

下 载：中国国家流感中心网站 (<http://ivdc.chinacdc.cn/cnic>) 或中国流感监测信息系统提供下载。