

人禽流感疫情监测实施方案

为及时发现人间可能感染的禽流感病例，及时采取有效的预防控制措施，制订此监测方案。此项监测工作只在有禽流感疫情发生的省份开展。

一、监测目的

1、早期发现可能的人禽流感病例，及时采取有效的公共卫生措施，预防可能出现的人禽流感疫情传播蔓延。

2、了解当地监测时间段内流感流行毒株的变化情况。

二、监测范围及时限

发生禽流感疫情的县（区），发现禽流感疫情后连续监测1个月。

三、监测病例定义

1、体温 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ，伴有咳嗽或咽痛，并且发病前1周内与禽类接触史的病例。

2、不明原因肺炎病例。

四、监测点设立

在疫情发生所在县选择县人民医院、县儿童医院（无儿童医院，可选择有儿科诊疗科室的其它综合医院）以及疫情涉及乡（镇）辖区内所有乡（镇）卫生院和村卫生室作为监测单位。

五、监测工作内容

发现和报告符合监测病例定义的病例，并对监测病例采样进行血清学和病原学检测。

1、参加监测科室

所有涉及监测病例诊疗的科室均要参加监测工作。

2、监测病例报告

监测点发现监测病例，做好相关登记（见附表1），并立即电话报告当地县级疾病预防控制中心，各医疗机构每周一上午10：00前将上周的监测病例汇总表上报县（区）疾病控制中心（见附表3）。

3、采样

（1）采样责任人：县级医疗机构医务人员承担本院监测病例的采样工作，县（区）疾病控制专业人员负责乡镇卫生院、村卫生室监测病例的采样。所有标本采集一式二份，并填写“人禽流感监测病例采样登记表”（见附表2）。

（2）样本运送的时间要求：县（市、区）疾病预防控制中心负责将样本运送到省级疾病预防控制中心实验室。运送的时间要求：有条件的地区，样本于采样后24小时内送到；无条件的地区，样本集中保存在县疾病控制中心的 -20°C 以下的冰箱里，于采样后48小时内送到。

表2： 医院人禽流感监测病例采样记录表

编号	家长姓名	患者姓名	性别	年龄	职业	现住址及联系电话	发病日期	主要临床症状			采样日期	采样方式		
								体温 ℃	咳嗽	咽痛		鼻咽拭子	含漱液	血清

填写说明：病人年龄≤14岁，需填写家长姓名。

表3： 医院（疾病预防控制中心）人禽流感监测病例统计报表

日期 (年/月/日)	星期	各年龄组（岁）流感样病例数					肺炎病例数	门诊病例总数
		0—	5—	15—	25—	≥60		
	一							
	二							
	三							
	四							
	五							
	六							
	日							
——	合计							

填表说明：

- 1、此表由监测医院填写（也可作为各级疾病预防控制中心的统计报表）。
- 2、此表内的流感样病例必须是发病前 1 周内与禽类有接触史的病例。
 - 2、所填数字为监测发现的所有监测病例的统计数。

报告人： 报告日期： 年 月 日